



SÍMPTOMES	REFREDAT	GRIP ESTACIONAL	GRIP A
Febre	NO O NOMÉS DÈCIMES	SEMPRE (38°C A 39°C) DURANT DIES	SEMPRE (38°C A 40°C) S'INICIA ABANS I ÉS MÉS INTENSA
Cefalea	OCASIONAL	SÍ, DES DE L'INICI	SÍ, DES DE L'INICI
Malestar general	MÍNIM	SÍ, INTENS I MOLEST	SÍ, INTENS I MOLEST
Dolor d'ossos	NO	MOLT FREQUENT	MOLT FREQUENT
Debilitat i cançament	NO	INTENSA I INCAPACITANT DE 2 A 3 SETMANES	INTENSA I INCAPACITANT DURA MENYS D'UNA SETMANA
Congestió nasal	INTENSA I INCÒMODA	SÍ	SÍ
Esternuts	FREQÜENTS	SÍ	SÍ
Tos	FREQÜENT I IRRITANT	SÍ	SÍ, MOLT MÉS INTENSA I CONSTANT. MÉS ENCOMANADISSA
Coll	RESSEC I DOLORÓS	MOLÈSTIES LLEUS	MOLÈSTIES LLEUS
Malestar de pit	LLEU	POT SER MOLT INTENS	POT SER MOLT INTENS

COMPLICACIONS POSTERIORIS

Pneumònia	NO	SÍ, DEL TÍPUS PNEUMOCÒQUICA	SÍ. RÀPIDA AFECTACIÓ EN ELS DOS PULMONS I MOLT GREUS EN UN PETIT NOMBRE DE MALALTS
Mortalidad	NO	500.000 EN EL MÓN CADA ANY	ES CALCULA QUE SERÀ MENOR QUE LA GRIP ESTACIONAL